



Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE

PERIODE DU 01/11/2017 AU 10/11/2017

N°404

I. Conditions météorologiques :

La situation générale de la décade a été caractérisée par un renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le nord et le centre du pays avec le renforcement des vents de Nord-est à Est avec une visibilité affectée à réduite par le sable particulièrement sur l'Est du Tagant et de l'Adrar, sur le Nord des deux Hodh et de l'Assaba et sur le Brakna, le Trarza et L'Inchiri.


Les températures maximales ont varié entre 24 °C à NDB et 40 °C sur le Sud des deux Hodh, du Guidimagha et du Gorgol, tandis que les températures minimales ont varié entre 15 °C sur l'extrême Nord de Tiris-Zemour et 25 °C sur le sud du Gorgol. Le ciel était passagèrement moyennement nuageux (Source ONM).

II. Conditions écologiques :

D'une façon générale, les conditions écologiques sont restées défavorables à la reproduction et à la survie des criquets dans la plus part du territoire. Cependant, quelques sites localisés, au niveau du centre du pays (Oueds, interdunes et Graras), referment encore des conditions favorables aux criquets.

III. Situation acridienne :

Au cours de cette décade, la situation acridienne est restée calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, sur 131 points d'observation effectués par les équipes de prospection, le Criquet a été observé au niveau de 21 points où des ailés matures et immatures isolés ont été observés (voir la carte ci-dessous).



Carte situation acridienne 1^{ère} décade novembre 2017 (Reverdissement 21-31 octobre 2017 source IRI)

IV. Dispositif :

Le dispositif de surveillance est composé de **5 équipes** déployées comme suit :

- 2 équipes en Adrar et en Inchiri ;
- 2 équipes au Trarza ;
- 1 équipe au Brakna et au Tagant ;

NB : A la fin de cette décade, trois équipes de prospection ont été rappelées au Centre. Cette diminution du dispositif est justifiée par l'accalmie de la situation acridienne et l'absence de conditions écologiques favorables au développement des acridiens.

V. Traitement :

Aucun traitement n'a été effectué au cours de cette période.

VI. Stock de pesticides :

Le stock de pesticides disponible au CNLA est de 40000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.

VII. Prévisions :

Compte tenu de l'accalmie en cours et le rétrécissement des zones favorables au développement acridien, on ne s'attend pas à un changement significatif de la situation acridienne au cours des semaines à venir.

Glossaire :

Tailles des essaims et des bandes larvaires

	Essaim	Bande larvaire
Très petit(e)	< 1 km ²	1 – 25 m ²
Petit(e)	1 – 10 km ²	25 – 2500 m ²
Moyen(ne)	10 - 100 km ²	2500 m ² - 10 ha
Grand(e)	100 - 500 km ²	10 - 50 ha
Très grand(e)	> 500 km ²	> 50 ha

(Source : DLIS).