



Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

**BULLETIN D'INFORMATION
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**


PERIODE DU 01/08/2014 AU 31/08/2014

N°323

I. Conditions météorologiques :

La situation générale a été caractérisée par une position très élevée du FIT au voisinage de Tiris Zemmour et au Nord du Tagant à la fin de la deuxième décennie avec le renforcement de la dépression thermique sur le centre et le nord du pays. Cette situation a favorisé le développement des activités pluvio-orageuses au cours de la troisième décennie, particulièrement sur le deux Hodh, l'Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, le Brakna et le Trarza y compris Nouakchott. De faibles activités pluvio-orageuses isolées ont été observées sur l'Adrar, l'Inchiri, Tiris-Zemmour et sur le Tagant.

Les pluies enregistrées au cours du mois d'août ont beaucoup amélioré la situation du couvert végétal particulièrement au niveau de deux Hodh, de l'Assaba et du Guidimagha. Malgré cela, des poches encore déficitaires persistent au deux Hodh, l'Assaba, Gorgol et au Brakna. Quant à la situation au niveau du Trarza, du Tagant, de l'Adrar et de l'Inchiri, elle reste déficitaire pour le moment (Source ONM).



Précipitations estimées (source IRI)


II. Conditions écologiques :

Suite aux quantités de pluies significatives enregistrées au cours de ce mois d'août, les conditions écologiques de survie et de reproduction du Criquet pèlerin sont favorables dans la quasi-totalité des régions du centre, du sud et du sud-est du pays. Dans toutes les localités visitées par les équipes de prospection extensive, le couvert végétal annuel est en développement et les pérennes sont en reverdissement. L'humidité du sol est, de façon générale, proche de la surface.

III. Situation acridienne :

Les prospections extensives menées durant ce mois (du 14 au 28 août 2014) par deux équipes ultra-légères du CNLA ont fait part d'une situation d'accalmie sur l'ensemble de leurs itinéraires. Cependant, quelques ailés solitaires immatures et matures en faible densité ont été localisés au niveau du sud et sud-est du pays. Il s'agit de :

- 6 (six) ailés au niveau du Dhar de Néma (Sud-est)
- 2 (deux) ailés dans Khatt El Moinan (Centre)
- 1 ailé dans l'Aouker au nord de Temessoumit (Centre)



Carte de la situation acridienne en Mauritanie (Août 2014)

IV. Traitement :

Aucun traitement n'a été effectué durant ce mois d'août 2014.

V. Dispositif :

Deux équipes de surveillance acridienne ont été déployées entre le 14 et 28 août 2014 pour couvrir les zones de reproduction estivale (Sud-est, Sud et le Centre du pays).

VI. Stock de pesticides :

La dernière mise à jour (mars 2014) de la base de données de gestion des stocks de pesticides montre que le stock de pesticides est de **43 400 litres** de Chlorpyrifos 240.

VII. Prévisions :

Au cours des prochaines décades, on s'attend à la continuité de l'amélioration des conditions écologiques favorables à la survie et à la reproduction des Criquets. L'amorçement d'une reproduction acridienne à petite échelle pourrait avoir lieu, au niveau du Sud et du Centre du pays, du fait de la présence des conditions écologiques favorables. Ainsi, des incursions de populations acridiennes allochtones en provenance de l'est et du Sud-est du pays restent plausibles.