



Ministère de l'Agriculture  
Centre National de Lutte Antiacridienne

## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 01/01/2017 AU 10/01/2017 N°386

### **I. Conditions écologiques :**

Les conditions écologiques demeurent favorables à la survie et à la reproduction des Criquets dans le nord du pays précisément au nord-ouest de Tiris Zemmour et au niveau des oueds et des graras situés en Inchiri et en Adrar.


Ailleurs, dans le sud (y inclus le Trarza) et le sud-est du pays, on note que les conditions sont devenues défavorables au développement des acridiens.

### **II. Situation acridienne :**

La situation acridienne demeure caractérisée par la continuité de la baisse de présence des criquets au niveau des zones prospectées allant du centre vers le nord du pays. Cette situation pourrait être décrite comme suit :

**L'ouest et le centre du pays (Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou) :** dans ces régions, on note encore la présence d'un effectif d'ailés matures et immatures en faibles densités. En Adrar, les prospections révèlent la localisation des ailés matures et immatures avec des densités allant de 100 à 1200 individus/ha en mélange parfois à des larves de stades de L<sub>3</sub> à L<sub>5</sub> en faibles densités. Ces infestations deviennent moins denses en Inchiri et au Dakhlett Nouadhibou.

**Nord du pays (Tiris Zemmour) :** malgré la présence de conditions écologiques favorables au développement des acridiens, les équipes de prospections n'ont localisé qu'un effectif d'ailés matures et matures isolés (voir la carte).



*Carte situation acridienne 1<sup>ère</sup> décade janvier 2017 et du couvert végétal (reverdissement 11-20 décembre 2016 source IRI)*

### **III. Traitement :**

Au cours de cette décade, aucun traitement n'a été effectué. Le cumul des superficies traitées à **17060** ha.

### **IV. Dispositif :**

Compte tenu de la baisse de la situation acridienne observée ces derniers jours, le dispositif d'intervention a été réduit à 10 équipes de prospection lutte en plus d'une équipe de coordination. Ce dispositif est déployé comme suit :

- 3 équipes en Adrar ;
- 2 équipes en Inchiri ;
- 1 équipe au Dakhlet Nouadhibou ;
- 4 équipes au Tiris Zemmour ;
- 1 équipe de coordination.

### **V. Prévisions :**

Au vu des effectifs acridiens localisés en faibles densités au niveau du centre du pays d'une part et les conditions écologiques favorables au Nord et dans une moindre mesure dans le centre du pays d'autre part, on s'attend, dans les jours à venir, à la continuation de la baisse des infestations acridiennes dans le centre du pays. Ainsi, le déplacement de ces effectifs dispersés vers le Nord et le Nord-ouest et le début d'éventuelles reproductions hiverno-printanières dans cette région où les conditions écologiques seront plus favorables.

### **Glossaire :**

Tailles des essaims et des bandes larvaires

	<b>Essaim</b>	<b>Bande larvaire</b>
Très petit(e)	< 1 km <sup>2</sup>	1 – 25 m <sup>2</sup>
Petit(e)	1 – 10 km <sup>2</sup>	25 – 2500 m <sup>2</sup>
Moyen(ne)	10 - 100 km <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup> - 10 ha
Grand(e)	100 - 500 km <sup>2</sup>	10 - 50 ha
Très grand(e)	> 500 km <sup>2</sup>	> 50 ha

(Source : DLIS)