



Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage  
Centre National de Lutte Antiacridienne

## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 01/10/2007 AU 10/10/2007

N°134

### **I- Situation Ecologique et Acridienne :**

Cette décade a été caractérisée par la présence de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique avec 1017-1033 HPA. La dépression thermique a été divisée en deux noyaux sur le centre du pays avec 1007- 1009 HPa. La position moyenne du FIT se situe au voisinage de Nouakchott, Tidjikja et sur les Hodhs.

Le régime du vent au cours de la décade était de Nord à Nord-Est au Nord du FIT avec des visibilités affectées à réduite par sable, alors que la pénétration de la mousson a été faible au sud du FIT. Malgré la faible intensité de la mousson des activités pluvio-orageuse isolées ont données des pluies sur le sud et le Sud-est du pays notamment sur les deux Hodhs, le Sud de l'Assaba, le Gorgol et le Guidimagha .

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites :

[http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp\\_msg&cat=mpp&lang=eng&zone=MR](http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=eng&zone=MR) ou [www.onm.mr](http://www.onm.mr)

Au cours de cette décade, la situation acridienne s'est caractérisée par la présence d'un effectif d'ailés matures en dispersion dans les régions du Centre et du Nord-ouest (Tagant, Brakna, Trarza, Inchiri et Adrar) avec des densités allant de 1 à 32 ind/site.

On note également une concentration d'ailés matures dans la région centrale (Tagant et Brakna) avec une densité de 2 ind/transect de 1X100m au point 18°24N/09°25W ainsi que des larves de stades L<sub>1</sub> à L<sub>4</sub> avec une densité allant de 2 à 5 larves/site.

Un dessèchement progressif de la végétation annuelle est observé au Sud et Sud-est du pays (la plupart des graminées sont en fin de cycle), par contre, les conditions écologiques demeurent favorables à la reproduction du criquet dans la partie sud ouest et le centre du pays, où la végétation annuelle est encore en développement avec une couverture moyenne de 35%.

### **II- Dispositif :**

Le dispositif d'intervention est composé de cinq équipes réparties comme suit :

L'équipe N° 1 : Est -Tagant

L'équipe N° 2 : Nord Brakna et Ouest Tagant

#### **Centre National de Lutte Antiacridienne**

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

L'équipe N° 3 : Trarza (aouker de Boutilimit, Rkiz et les dépressions de Fai)


L'équipe N° 4 : Inchiri

L'équipe N° 5 : Sud et Est Adrar

### III- Prévisions :

Au cours des prochaines décades, on s'attend à une reproduction locale à petite échelle au niveau du centre et un déplacement vers le centre du pays de l'effectif dispersé du sud.

## Situation du criquet pèlerin /1<sup>o</sup> Décade Octobre 2007



### Centre National de Lutte Antiacridienne

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)