

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -

Médaille expo 2000



BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE

PERIODE DU 21 AU 30/11/2003

N° 20/2003

I. Conditions Ecologiques

La situation générale est dominée par l'anticyclone des Açores qui commande une dorsale modérée sur les Iles Canaries et l'Atlas marocain jusqu'au Sahara algérien. Le FIT se positionne entre le 07° et 08° Nord.

Au nord du FIT le vent est de secteur Nord et Nord-Est faible à modéré avec de bonne visibilité sur tout le littoral Ouest Africain.

Au sud du FIT le ciel généralement nuageux sur la basse côte avec des brumes côtières.

Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à la reproduction au centre et au nord du pays. Cependant la végétation annuelle demeure verte, parfois en plein développement et en début de pousse au Tagant, Brakna (Agane), Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiriss Zemmour.

II. Situation Acridienne

La situation acridienne se présente comme suit :

- Au niveau du Centre : La zone d'Agane et des Aoukers a connu au début de la décade une forte infestation de jeunes ailés roses sur une superficie d'environ 400 ha. La situation s'est nettement améliorée après les intenses traitements effectués par les équipes sur place. Par contre à la fin de la décade des bandes larvaires L1, L2 sont apparues dans la zone de Kadouacha (Agane).
- Dans le sud de l'Adrar et de l'Inchiri : La situation est restée caractérisée par la présence d'une population d'ailés matures sous forme de groupe et des bandes larvaires descendant la montagne. Des groupes d'ailés ont été observés en mouvement vers le nord.
- Au niveau de Tiris Zemmour: La situation est restée dominée par la présence de groupes d'ailés très denses. A la fin de la décade des éclosions ont eu lieu au nord de Zouerat à **Tenyemoumat 23° 18' 30'' N / 12° 31' 02'' W.**

III. Traitements

DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE

Centre de Lutte Antiacridienne

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: claa@toptechnology.mr

1/ Traitement en couverture totale :

Au cours de cette décade **1175 ha** ont été couverts par **24** opérations de traitement manuel et motorisé contre des groupes d'ailés et des larves de différents stades. La quantité de produit utilisée est de 590 litres de Cyhalon 4% et **292,5** Chlorpyrifos 450 ULV. Ce qui porte le cumul des superficies traitées à **5458,08 ha** à l'aide de **150** opérations de traitement avec **434,87** litres de Chlorpyrifos 450 ULV et **4985,4** litres de Cyhalon 4%.


2/ Traitement en barrière :

Au cours de cette décade 4271 ha ont été protégés par **57** opérations avec **338,64** litres d'Adonis et **24,6** de Nomolt; ce qui porte le cumul des superficies protégées à **8889,25 ha** avec **73** opérations de traitement en barrière avec **729,79** litres d'Adonis.

IV Dispositif

Le dispositif d'intervention a été renforcé par une 8^{ème} équipe.

Situation du criquet pèlerin /3^o Décade Novembre 2003



DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE

Centre de Lutte Antiacridienne

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: claa@toptechnology.mr