



Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage  
Centre National de Lutte Antiacridienne

## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 21/09/2007 AU 30/09/2007

N°133

### **I- Situation Ecologique et Acridienne :**

Cette décade a été marquée par le renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores 1015-1028 HPA et la présence de la dépression thermique sur le Nord de la Mauritanie avec 1005-1008 HPA.

La position la plus élevée du FIT, au cours de la décade, a été observée au Nord d'Akjoujt, pendant que la position moyenne se situe au voisinage de Rosso, Tidjikja et les deux Hodhs. Au Nord de cette zone, le régime des vents était de Nord à Nord-est avec hausses des températures et visibilité affectée à réduite par le sable. Au Sud du FIT, la pénétration de la mousson a favorisé le développement des foyers pluvio orageux.

Au cours des cinq premiers jours de la décade prochaine, le FIT se retirera au Sud de Rosso avec des réductions de la visibilité par sable et hausse de la température sur le centre du pays,

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites :

[http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp\\_msg&cat=mpp&lang=enq&zone=MR](http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/infocus.php?page=mpp_msg&cat=mpp&lang=enq&zone=MR) ou [www.onm.mr](http://www.onm.mr)

Au cours de cette décade, la situation acridienne s'est caractérisée par la localisation d'ailés immatures au sud-est du pays avec des faibles densités (2 à 8 ind/site). Au niveau du centre, les opérations de prospection ont révélé la présence d'ailés matures avec une densité plus élevée allant de 1 à 27 ind/site (27 ind au point 18°07N/11°56W) ainsi que des larves du stade 1 et 2 avec une dominance du 2<sup>ème</sup> stade et des densités variant entre 2 et 8 larves/site.

En dépit du dessèchement avancé de la végétation annuelle observé au Sud et Sud-Est du pays, les conditions écologiques demeurent favorables à la reproduction du criquet par endroit dans le sud et dans la majeure partie du centre du pays.

### **II- Dispositif :**

Le dispositif reste inchangé et son positionnement est le suivant :

L'équipe N° 1 Hodh El Charghui : le batene de Timbedra et le Dhar de Oualata.

**Centre National de Lutte Antiacridienne**

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)

L'équipe N° 2 Nord Brakna et Ouest Tagant.


L'équipe N° 3 Trarza : Zone de R'kiz et Awker Boutilimit.

L'équipe N° 4 Assaba : Nord Kiffa, Taskast et Ouest Tamchekett

L'équipe N° 5 Hohd El Gharbi : Awker Aioun et Est Tamchekett.

### III- Prévisions :

Au cours des prochaines décades, on s'attend à une reproduction locale à petite échelle au niveau du centre et un déplacement vers le centre du pays de l'effectif dispersé du sud. Un redéploiement du dispositif de prospection est cours d'exécution.



### **Centre National de Lutte Antiacridienne**

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)